~~n° 17~~ n° 31.

rapport.

Mr. Faure le jeune chirurgien à Toulouse est l'auteur de l'observation dont nous sommes chargés de rendre compte à l'academie.

Cette observation fait mention d'une luxation complette de l'astragal en dedans à son articulation avec le scaphoide, et rupture de tous les ligaments qui le joignent avec les autres os du tarse, de maniere qu'il faisoit saillie en dehors de trois à 4. travers de doigt sans fracture: Cet accident est arrivé le 11. Juin 1780, à un jeune homme agé d'environ 23. ans aiant fait une gageure avec ses camarades de sauter un fossé d'environ 14 pieds de large, que n'aiant pû l'affranchir il appuya le bout du pied sur le bord du fossé opposé et tomba sans connoissance, ses camarades voiant saigner la jambe crurent qu'il se l'étoit fracturée; Ils l'apporterent chez lui et Mrs. Faure freres furent mandés trois quart d'heure apres la chute, deja la jambe etoit extremement tendue, les muscles dans une contraction violente, la peau qui avoit été dechirée s'etoit engagée entre la tete de l'astragal et le bord du scaphoide, ils la degagerent en faisant une incision à la faveur d'une sonde crenellée qu'ils introduisirent avec difficulté, et à la faveur de cette incision ils degagerent la peau et l'extremité des ligaments rompus, ce qui leur donna la facilité de faire la reduction sans beaucoup de difficulté, la playe fut pansée avec la charpie seiche, des compresses graduées pour maintenir l'os à sa place, et le tout soutenu avec un bandage à 18. chefs imbu d'eau de vie mr. Faure n'a rien negligé pour combattre les accidents primitifs, une diette severe, les saignées rapprochées

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 41
n° 27

au nombre de 12. à 14. les jours Suivants pour combattre la fievre, l'engorgement jnflammatoire et les mouvements convulsif qui Si etoient joints, Enfin malgré tous ces Soins il Survint des élancemts par toute la jambe, ce qui fit Soubconner à mrs fauve et Sarbes appelé en consultation qu'il Se formoit quelque depot, En effet neuf à dix jours apres la chute, jls trouverent le lendemain à la levée de l'appareil la playe jnondée d'une matiere Sanguinolente Sortie d'une ouverture qui S'etoit faite à la partie lateralle externe de la jambe, et la peau qui environoit cette ouverture etoit gangrenée d'un pouce dans Sa circonferance, jls la dilaterent haut et bas pour donner jssue aux matieres Ce qui Soulagea le malade, jl Survint encore plusieurs depots qui furent ouverts, et le malade fut de mieux en mieux et Sa guerison parfaite au bout de deux mois à l'exception d'une anckilose du pied et marche Sans bequille, on espere d'achever la cure par l'usage des eaux de Bareges.

L'observation dont nous venons de faire l'extrait, presente un fait rare dont quelques autheurs ont peine à concevoir qu'il arrive Sans causer des dés~~ordres~~ accidents qui obligent de recouvrir promptement à l'amputation de la jambe. En effet le dechiremt. de tous les ligaments de l'articulation annoncé par l'auteur, La Sortie ou le deplacemt. de trois a quatre travers de doigt de l'astragal en dehors, quoi-que Sans fracture, presente un desordre qui doit necesserement. entrainer des accidents trés graves: J'avoüe que je concois difficilement que

Lastragal puisse supporter vn tel deplacem.^t
quon se represente de la maniere dont il est joint
et enclavé (pour ainsi dire) avec les autres os du
tarse et par de forts ligaments qu calcaneum
quon mesure le diamettre et letendue de cet os,
on verra limpossibilité que lastragal puisse
fournir vn deplacem.^t pareil; passons ici lexageration
qui a pu en imposer a lauteur eu egard a ce grand
deplacem.^t mais il nous annonce avec vn
jugem.^t reflechi, la rupture de tous les ligam.^ts
qui le joignent avec tous les autres os du tarse,
et quil fit la reduction sans beaucoup de
difficulté, on se persuadera aisement que m.^r
faure na pas du rencontrer beaucoup dobstacle
a remettre los en sa place, puisquil annonce
la rupture de tous les ligam.^ts de larticulation,
mais il paroitra plus difficile de concevoir
quun desordre pareil a celui cy puisse etre
terminé au point de mettre le malade en etat
de marcher sans bequilles au bout de deux
mois, quil ne reste quune ankilose du
pied dont il espere achever la cure par
lusage des eaux de bareges.

Pour chercher a eclaircir vn fait qui demande
a etre revetu de toutes les circonstances avant de
ladmettre, nous presumons davance que m.^r faure
voudra bien nous donner les eclaircisem.^ts suivants.

1o. Les autres os du tarse lui ont ils paru avoir souffert
du deplacement.

2o. Pense til affirmativem.^t que tous les ligaments de
larticulation ont eprouve vne rupture complette.

3o. De nous donner vne description de letat present de
larticulation du pied et de la difformité quil y observe,
comparé avec letat sain.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

4°. Enfin la profondeur du fossé et la nature du sol, et s'il est posible de sçavoir, si le blessé n'a pas tombé sur ses pieds. Deliberé à Paris ce 6. fevrier mil sept cens quatrevingt un.

Delaporte